

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP - 5 - 6 - 69 936176

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 5 AU BULLETIN N° 104 DE MAI 1969

27 mai 1969/n° 19

V I G N E

AVERTISSEMENT.-

Mildiou : Les premières taches de mildiou sont signalées les 25 et 26 mai. En raison de la situation météorologique instable et du stade végétatif observé dans la majorité des parcelles un traitement fongicide devra être appliqué sur l'ensemble du vignoble dès réception de cet avis.

INFORMATIONS.-

Pyrale : Comme nous l'avons signalé dans notre avis du 16 mai la sortie des jeunes chenilles a été observée. Appliquer un traitement insecticide si cela n'a pas encore été fait, ou le renouveler, surtout en cas de forte pullulation.

Oïdium : Un soufrage devra être appliqué sur les "blancs" qui par ailleurs seont ainsi défendus contre l'érinose.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS.-

Tavelure du pommier et du poirier :

De nouvelles taches de tavelure étaient visibles dès le 25 mai et leur sortie va se poursuivre au cours de la semaine. Une protection des vergers est à assurer dès réception de l'avis.

Note d'information

- le Feu bactérien (*Erwinia amylovora*) est la plus dangereuse maladie bactérienne du poirier. Si jusqu'à présent cette maladie n'a jamais été trouvée en France, la vigilance doit être de rigueur, aussi importe-t-il de signaler au Service de la Protection des Végétaux les arbres qui présenteraient les symptômes suivants :

- pousses dont les feuilles noircissent tout en restant attachées à l'arbre donnant l'impression d'être brûlées, d'où le nom de la maladie.

.../...

- sur un arbre atteint, les jeunes fruits prennent aussi une couleur vert olive foncé, brunissent et se flétrissent. Les parties malades prennent une apparence huileuse et laissent exsuder des gouttelettes. Comme les feuilles et les pousses atteintes, les poirettes momifiées restent accrochées à l'arbre.

- le Feu bactérien est capable de s'attaquer à de nombreuses espèces végétales fruitières, ornementales et sauvages : Cognassier, Néflier, Prunus, Cotoneaster, Pyracantha, Aubépine.

Cette maladie bactérienne existant dans le Nord de l'Europe, il est à craindre qu'elle ne s'étende bientôt à la France. Une attention toute particulière devra être apportée à l'apparition des symptômes sur Aubépine (haies) ou sur végétaux d'ornement importés.

GRANDE CULTURE

AVERTISSEMENT.-

Mildiou de la pomme-de-terre :

Il est conseillé de réaliser avant le 3 juin un traitement fongicide sur les variétés sensibles à cette maladie, pour les cultures sorties avant le 2 mai et situées dans des conditions très favorables au mildiou (fond de vallée ou "cuvettes" - terrain momentanément inondé - présence de rideaux d'arbres - proximité de tas de déchets non détruits au 1er mai).

INFORMATIONS.-

Pégomyie de la betterave :

Les pontes sont maintenant moins abondantes et la végétation des betteraves se montre plus active. Continuer à surveiller les cultures mais les interventions, motivées par la présence de nouvelles mines, doivent être exceptionnelles et n'intéresser que des cultures peu vigoureuses.

Puceron noir de la betterave :

Les colonies de pucerons se maintiennent malgré un temps froid et pluvieux.

L'action des prédateurs ne devant pas se manifester avant quelque temps intervenir éventuellement si les plantes réagissent à la présence des pucerons. Utiliser un produit endothérapique (systémique).

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

R. PARIS - H. de MEIRLEIRE - A. GODIN

l'Inspecteur de la circonscription
Phytophytaire "CHAMPAGNE"

J. DELATTRE.